

FÖLJESEDEL Gård & Djurhälsan NÖT 2019

DJURÄGARE

Namn

Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Remitterande veterinär

Provtagningsdatum åååå-mm-dd

SE-nummer

E-post

Var mycket noggrann när du skriver din e-postadress!

Djurägarens underskrift, jag intygar att jag är kund till
Gård & Djurhälsan BAS/PLUS/TOPP

OBS! Märk påsarna med namn på betet eller individnummer.

ANALYSER

- Grundanalys.** Mag-/tarmparasiter (EPG) och koccidier (OPG), rutinprov enligt instruktion. Proverna poolas på labbet.

INFORMATION OM DJUREN

Prov från:

- Kalvar på stall, yngre än tre månader
 Förstagångsbetare, dikalvar/amkalvar
 Förstagångsbetare, avvanda kalvar/ungdjur
 Andragångsbetare, ungdjur
 Vuxna djur
 Ej nötkreatur, ange: _____

TILLÄGGSANALYSER

Provtagning är godkänd av veterinär på Gård & Djurhälsan, ange veterinärens namn och datum:

- Stora leverflundran
 Odling Ostertagia/Cooperia
 Individprover
 Övrigt: _____

Övriga uppgifter (anledning till provtagning, eventuell gruppering av prover, meddelande till laboratoriet mm):

Parasitprovtagning för kunder till Gård & Djurhälsans paket BAS/PLUS/TOPP

Ta träckproven så här:

1. Ta individuella prov, ca två matskedar träck, från sex djur per betesgrupp som ska provtas. Träckproverna skall tas från färsk, fortfarande varm träck.
2. Lägg varje individprov i en plastpåse. Om proverna är mycket lösa, använd plastburkar med tättslutande lock (typ filmburk eller rekvirera från labbet). Blanda aldrig träck från flera djur i samma påse/burk.
3. Märk påsarna/burkarna med namnet på betet eller individnummer.
4. Fyll i följesedeln noggrant och lägg den tillsammans med de väl förpackade proverna i ett vadderat kuvert. Förvaras kallt fram till postning. OBS! EJ I FRYS! OBS! Märk kuvertet "Biologiskt material utan smittrisk".
5. Skickas till Vidilab, Box 33, 745 21 Enköping – söndag, måndag, tisdag eller onsdag

På labbet kommer proverna att poolas 3 och 3. Svar lämnas en eller två dagar efter det att provet kommit till laboratoriet. Ring gärna labbet om du undrar över något.

Provtagningsmaterial

Du kan lägga proverna i valfri plastpåse och posta proverna i valfritt vadderat kuvert enligt anvisning ovan. Alternativt kan du beställa förfrankerade kuvert och påsar/burkar genom att gå in på NÖT-sidan på www.gardochedjurhalsan.se och klicka på "Blanketter och remisser".

Provtagningsstidpunkt för grundanalysen (mag-tarmparasiter) för betesdjur

Den mest lämpliga provtagningsstidpunkten är 4-6 veckor efter betessläpp, men kan behöva anpassas efter gårdens förutsättningar, exempelvis efter åldern på kalvarna. Prata med din veterinär för mer information.

Vid misstanke om beteskoccidios (*E. alabamensis*) är lämplig provtagningsstidpunkt tre dagar efter att diarrén debuterat, ofta ca 10 dagar efter betessläpp.

TIPS!

När träckprov ska tas från djur på bete är det enklast att långsamt närma sig djuren när de vilar. När de reser sig kommer många av dem att bajsas och prover går sedan att plocka från de djur man vill provta. Det är inte nödvändigt att veta vilka individer i en betesgrupp som är provtagna utan endast att proverna kommer från den djurkategori man är mest intresserad av att provta.

Fylls i av laboratoriet:

Analyskoder: _____