

## Stalltips:

# BRUNSTSYNKRONISERING ALTRESYN


Brunstsynkronisering av gyltor är en metod för att styra brunstdatum i grupper av gyltor. Gyltorna måste vara köns mogna och ha en dokumenterat fungerande reproduktion.

### DU BEHÖVER:

- Skyddshandskar
- Av veterinär utskrivet ”startkit” för behandlingen samt utrustning för preparattilldelning
- Träningsdryck, förslagsvis äppeljuice
- Märkstift

### GÖR SÅ HÄR:

- Kontrollera och dokumentera minst en brunst hos varje gylta
- Planera 4 veckor innan förväntad betäckning
  - 1) Träna djuren i 3–4 dagar med t.ex. äppeljuice inför behandling
  - 2) De gyltor som ska betäckas börjar sin behandling med brunstsynkroniserande preparat 23 dagar innan förväntat betäckningsdatum för gruppen de ska semineras med.
  - 3) Ge behandlingen vid samma tidpunkt varje dag i 18 dagar, märk djuren som har fått sin dagliga tilldelning.
  - 4) När du slutar ge behandlingen, börja brunstkontrollera gyltorna och inseminera när gyltan visar ståbrunst.



### TÄNK PÅ DETTA:

- Minst en brunst ska finnas dokumenterad innan brunstsynkronisering påbörjas
- Tilldelningen av behandlingen ska dokumenteras enligt veterinärs anvisningar
- Flushing påbörjas dag 13 efter första behandling
- Inseminationsdatum av gyltor ska dokumenteras
- Resultat från dräktighetstest bör dokumenteras för vidare uppföljning

Dräktighetskontrollera de behandlade djuren tidigast 24 dagar efter insemination.

