



Stalltips:

KULLUTJÄMNING

Nuläge i besättningen:

Mål i besättningen:



INNAN KULLUTJÄMNING PÅBÖRJAS

- Spädgrisarna ska dia råmjölk i minst 12 timmar efter födelsen. Anteckna därför alltid när grisningen är avslutad.
- Tillämpa skiftedivning i stora kullar så att alla grisar får tillräckligt med råmjölk
- Kontrollera och notera suggans antal fungerande spenar. Suggan kan bara ha så många diande smågrisar som hon har fungerande spenar till.
- Kontrollera suggans hälsotillstånd och att hon är uppe och dricker vatten efter grisningen.

KULLUTJÄMNING

- Utnyttja i första hand övertaliga spenar hos nygrisade sugor med mindre kullar.
- Flytta i första hand stora grisar från kullen. Tänk på att grisarna som flyttas till en kull ska vara minst lika stora som suggans egna spädgrisar.
- Små spädgrisar som ska flyttas bort från kullen bör flyttas till en 2:a eller 3:e kulls grisare som har korta, fina spenar och bra modersegenskaper. En 2:a eller 3:e grisare brukar vara de bästa suggorna att ta hand om tillflyttade spädgrisar.
- Det kan gå lång tid (3-8 timmar) innan de kullutjämnade grisarna får dia sin nya sugga. Grisarna som kullutjämnas måste därför vara livskraftiga nog för att klara flytten.
- Flytta så få spädgrisar som möjligt mellan kullarna, men flytta dem innan de har börjat bli eftersatta.
- Kullutjämnningen ska vara avslutad senast 36 timmar efter grisningen. Kullutjämnas det senare ökar risken att en spene som tidigare inte varit använd, har blivit sinlagd.



Som huvudregel trivs spädgrisarna bäst i den kull de är födda i. Därför ska det kullutjämnas så få grisar som möjligt. Var observant på om grisar är små, oroliga eller inte diar med de övriga grisarna i kullen. Dessa grisar kan läggas till en amsugga som får ta hand om spädgrisar som börjat bli svaga.