



Stalltips:

MAGSÅR

Nuläge i besättningen:

Mål i besättningen:

Grisar som drabbas av magsår kan vara mycket svåra att upptäcka och magsår kan utvecklas på bara ett par timmar. Låg kroppstemperatur, svart avföring, ökad andningsfrekvens, kräkningar och blekhet på grund av blodbrist är några av de symptom som kan uppstå vid kroniskt eller lätt blödande magsår. Grisen kan vid allvarligare magsår gnissla tänder och även matvägra. Magsår är besättningsrelaterat och nedan följer tips för att undvika uppkomsten av magsår.

RÅD FÖR ATT MINSKA FÖREKOMSTEN AV MAGSÅR

- Se till att ha korrekt struktur på ditt foder.
 - < 0,2 mm max 20 % av partiklarna
 - 0,2- 1mm minst 60% av partiklarna
 - >1 mm max 20% av partiklarna
- Blötfoder är fördelaktigt eftersom...
 - Finmalet foder ger färre magsår i blöt form än i torr form
 - Grisen utnyttjar foder med grov struktur bättre om det utfodras blött
- Om foder ges torrt är malet foder bättre än pelleterat foder, eftersom pelleterat foder innehåller mindre partiklar
- För att förhindra förekomsten av magsår ska grisen utöver kraftfoder även ges grovfoder eller halm.
- Regelbundna utfodringstider är bra för maghälsan hos grisen
- Alla grisar ska enkelt få plats vid foderträget och enkelt få tillgång till foder.
- Strömedel minskar förekomsten av magsår.
- En stressfri miljö är positivt för grisens allmänna hälsostatus.
- En gris som är frisk och äter minimerar risken för att utveckla magsår.



En korrekt struktur på fodret i kombination med strömedel är bra för grisens maghälsa.

