



Afrikansk svinpest kan se ut på många olika sätt

Rapportera alltid oväntade avvikelser i hälsoläget hos grisar.

Även små misstankar är viktiga!

Symtom vid afrikansk svinpest:

- Plötslig död/hög dödlighet (vanligast)
- Hög feber
- Rörelsestörningar
- Aborter
- Andningssvårigheter
- Blå missfärgning på huden
- Kräkningar och diarré
- Blödningar från tryne, mun och ändtarm

Gård & Djurhälsan har tagit fram smittskyddsinformation på flera olika språk – be din veterinär ta med sig de versioner du behöver eller ta kontakt med oss direkt!

Djurslagschefer

Katarina Karlsson Frisch, tel 0346-104 17, katarina.karlsson@gardochdjurhalsan.se
Ingvar Eriksson, tel 013-24 48 44, ingvar.eriksson@gardochdjurhalsan.se

Administration


Anna-Greta Enström, tel 0511-676 62, anna-greta.enstrom@gardochdjurhalsan.se

Övriga medarbetare hittar du på vår hemsida www.gardochdjurhalsan.se

Tel vxl 0771-21 65 00


www.gardochdjurhalsan.se





Smittan finns nära

Sedan 2014 är det pågående och upprepade utbrott av afrikansk svinpest i samtliga baltiska länder och Polen. Framförallt finns smittan bland ländernas population av vildsvin (gröna och orangea trekantar), vilket då och då genom direkt eller indirekt kontakt orsakar utbrott bland tamsvin (blåa och röda cirklar).



Förhindra smittspridning

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att ett djur drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Miss-tänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

Överlevnadstid för ASF-virus

- Gödsel i rumstemperatur: 11 dygn
- Blod vid rumstemp: 1,5 år
- Stallmiljö: 4 v
- Kött i rumstemp: 16 dygn
- Kylt kött: 150 dygn
- Saltat torkat kött: 140 dygn
- Fryst kött: flera år

Förhöjd risk i Sverige

Situationen innebär att risken för introduktion av sjukdomen till Sverige bedöms som förhöjd. Människor som reser från områden där afrikansk svinpest finns ses som den mest troliga källan till introduktion av smittan.

TÄNK DÄRFÖR PÅ ATT INFORMERA HELA PERSONALEN ATT:

- VÄNTA MINST 48 TIMMAR innan inträde i svensk besättning efter besök utomlands
- ALDRIG GE GRISARNA NÅGON FORM AV MATAVFALL
- Rengöra och desinfektera skor som använts utomlands innan gårdsplan och stallområde beträds
- Utrusta personalen med rena gårdsegna skor och arbetskläder
- Införa obligatorisk handtvätt innan personal och besökare går in i besättningen
- Alltid kontakta din veterinär om du känner dig osäker på hälsoläget bland dina djur



Läs även vår artikel på: