

Fakulteten för veterinärmedicin  
och husdjursvetenskap  
Institutionen för husdjurens miljö och  
hälsa

# Kunskap hos svenska veterinärer och fårägare om klövsjukdomar hos får

## En enkätstudie

*Lisa Berg*

*Uppsala  
2015*

*Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet*

*ISSN 1652-8697  
Examensarbete 20xx:xx*



**Gård&Djurhälsan**  
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

1



Tacka i flock om 10 djur. Hon har den senaste månaden börjat ha en onaturlig gång, och är lindrigt halt på ett bakben. Tackan har ingen feber, och ingen ökad värme kan kännas över klöven.

1. Förvuxen klöv
2. Tågranulom
3. Klövböld
4. Separation i vita linjen
5. Fång



2



Tacka i flock om 35 djur som började halta för ungefär en vecka sedan. Två andra tackor visar likadana symptom. Hela flocken genomgick klövklippning för några veckor sedan. Vid denna undersökning upptäcks en mjuk vävnad i tån, klövspalten ser normal ut.

1. Fång
2. Klövböld
3. Klövspaltseksem
4. Fotröta
5. Tågranulom



3



Tacka i flock om 90 djur som plötsligt börjat halta kraftigt på ett framben. Inga andra djur visar någon hälta. Vid undersökning är klöven varm och öm. Ett kort är taget underifrån och ett kort är taget från sidan.

1. Tågranulom
2. Klövspaltseksem
3. Klövböld
4. Fotröta
5. Hyperplasi i klövspalten



4



Tacka i flock om 50 djur, som börjat halta för ca 1 vecka sedan. Hältan har blivit värre och värre och nu kan tackan knappt stå upp, hon haltar på bägge frambenen. Då flera andra tackor i flocken också börjat visa tecken på hälta, undersöks alla djur, varpå man ser liknande förändringar på ytterligare 15 tackor.

1. Förvuxen klöv
2. Klövböld
3. Tågranulom
4. Fotröta
5. Separation i vita linjen



5



Tacka i flock om 27 djur som uppmärksammats vid klövklippningen. Hon har tidigare inte visat något tecken på sjukdom eller hälta och hennes allmäntillstånd är gott. Hon haltar mycket lindrigt på ett bakben.

1. Klövböld
2. Förvuxen klöv
3. Tågranulom
4. Separation i vita linjen
5. Fång



Tacka i flock om 34 djur, som uppmärksammats vid klövklippning. Djurägaren har inte noterat någon hälta men vid undersökning noteras att klövspalten är utan behåring och rodnande. Ytterligare en tacka i besättningen har liknande förändringar på en klöv, på resterande djur hittas ingenting.

6



Fotograf Åsa Hilmersson.

1. Klövböld
2. Klövspaltseksem
3. Fotröta
4. Förvuxen klöv
5. Hyperplasi i klövspalten



Gård&Djurhälsan  
FRISKA DJUR GER VÄLMAENDE GÅRDAR

# Rätt svar till frågorna

Fråga 1: Förvuxen klöv 1

Fråga 2: Tågranulom 5

Fråga 3: Klövböld 3

Fråga 4: Fotröta 4

Fråga 5: Separation i vita linjen 4

Fråga 6: Klövspaltseksem 2

