



Gård&Djurhälsan


FRISKA DJUR GER VÄLMÅENDE GÅRDAR

Afrikansk svinpest (ASF) – när ska jag misstänka sjukdom?

Afrikansk svinpest fortsätter att sprida sig i Europa. Introduktionerna till bland annat Belgien, Tjeckien och västra Polen visar att spridning med människor kan ske när som helst och till vilket land som helst, oberoende av avstånd till pågående smittspridning i vildsvinspopulationer.

Ett utbrott av afrikansk svinpest i Sverige drabbar inte bara grisnäringen hårt; skogsbruk, jordbruk, jakt och naturturism är exempel på andra verksamheter som kan komma att påverkas i olika grad. Dessutom inskränks allemansrätten i ett ASF-drabbat

område. Aktiviteter som till exempel orientering, bär- och svampplockning, fågelskådning i skog och mark, scouting etc. riskerar att bli otillåtet under den tid som utbrottet i ett område pågår, vilket i värsta fall kan röra sig om år.



Skydda dina grisar från vildsvinskontakt!

Smittspridningen i EU har främst skett i vildsvinspopulationen. I de fall där utbrott skett i tamgrisbesättningar har det ofta varit i besättningar med närhet till en smittad vildsvinspopulation via indirekt smitta.

Var finns riskerna i din besättning? Var skulle dina grisar potentiellt kunna ha direkt eller indirekt kontakt med vildsvin?

- Öppna portar och dörrar in till djuren?
- Ytor så som gårdsplan som beträds i samma skodon som inne i stallen?
- Maskiner som körs in i bäddarna?
- Foder, vatten och strö som nyligen har varit i kontakt med vildsvin?
- Finns det någon i besättningen som jagar vildsvin?

När ska jag misstänka Afrikansk Svinpest?

Afrikansk svinpest kan ha ett mycket snabbt förlopp där grisarna dör innan några symptom har hunnit observeras, men kan även ha ett långsammare förlopp med varierande sjukdomsbild som kan pågå under flera månader.

Vid akut sjukdom ses:

- Initialt ses hög feber, upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd
- Dräktiga suggor kastar

- Blåaktiga missfärgningar på delar av kroppen
- Ostadig och okoordinerad gång
- Andningssvårigheter, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses.
- Smittade djur dör vanligen inom fem till tio dagar

Även om sjukdomsbilden hos ett infekterat djur i typiska fall är dramatisk så kan det vara så att endast enstaka djur i en besättning drabbas i början. Det är inte heller säkert att djuret/djuren uppvisar alla ovanstående symptom. Därför är det viktigt att som djurägare vara uppmärksam och reagera på sjukdom som avviker från det vanliga.

Vem ringer jag?

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Misstänker du sjukdom är du skyldig att kontakta veterinär. Till dess att veterinären kan ta sig an fallet är du själv skyldig att göra allt du kan för att förhindra smittspridning. Du måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade grisar. Misstänkt smittade grisar får inte flyttas från det stall eller den besättning där de befinner sig.

Vad kan du göra för att förhindra introduktion av ASF?




Utfodra inte med matrester

Virus kan överleva flera år i kylt eller fryst kött och i rökta eller saltade produkter, därför är matavfall ett mycket viktigt spridningssätt till nya områden.




Sprid information till allmänheten

Hjälp till att bibehålla medvetenheten om sjukdomen hos gemene man. "Syns man inte finns man inte".



Kontakta omedelbart veterinär vid misstanke om ASF hos tamgris

Den som misstänker ASF är skyldig att meddela veterinär. Detta gäller vare sig du är djurhållare eller kommer i kontakt med djuren på annat sätt.



Rapportera in döda vildsvin

Tidig upptäckt är viktigt för att begränsa smittspridning. I de flesta drabbade länder har smittan introducerats i vildsvinsstammen först. Observationer av sjuka eller döda vildsvin ska därför rapporteras till SVA.



Upprätthåll smittskyddet

- 48 h karens efter besök utomlands
- Gårdsegna skor och kläder
- Handtvätt innan inträde i besättning
- Undvik direkt-och indirekt kontakt mellan vildsvin och tamgris!



EpizootiAkuten

Vad är en epizooti?

En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Vid misstanke om epizootisjukdom bestämmer lagen hur man ska agera. Syftet är att minska risken för vidare smittspridning. Några exempel på epizootisjukdomar är **Afrikansk Svinpest, Aujeszky's sjukdom, Klassisk svinpest, Mul- och klövsjuka, Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) hos gris, Swine Vesicular Disease och Mjältbrand.**

Vad ska jag göra om jag misstänker epizootisjukdom?

Den som sköter sina egna eller någon annans djur är skyldig att kontakta veterinär om djuren visar tecken på allvarlig smittsam sjukdom. Om du inte får tag på din ordinarie veterinär, ring närmaste jourhavande veterinär

Kontakta alltid veterinär vid:

- *Plötslig död/hög dödlighet*
- *Allvarlig sjuklighet som drabbar många djur*
- *Reproduktionsstörningar*
- *Många kastningar, omlöp, svagfödda, för tidiga grisningar etc.*
- *Plötslig hälta hos många djur*
- *Blåsor på tryne och kronrand*

I väntan på veterinären ska du göra allt du kan för att förhindra smittspridning. Misstänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig. Eventuella besök eller transporter (t.ex. foderbil, kadaverbil, slaktbil) avbokas.

Viktiga telefonnummer:

Ordinarie veterinär:

Jourhavande veterinär:

Foderleverantör:

Transportör:

Kadavertjänst:



Gård&Djurhälsan

FRISKA DJUR GER VÄLMÄENDE GÅRDAR

www.gardochdjurhalsan.se