

KLÖVATLAS

© Gård & Djurhälsan AB, 2022.



Normal klöv

1. Klövspalthuden är torr och behårad. Klövens mjuka horn och hårda horn möts i axialfåran. Vita linjen är förbindelsen mellan sulans mjuka horn och ytterväggens hårda horn.



2. Abaxialfåran syns normalt sett inte så tydligt, men markerar övergång mellan mjukt och hårt horn på utsidan av klöven. Klövkapslen möter benets hud i kronranden.



Klövklipping

Spar några millimeter av klövväggen så att fåret inte bär sin tyngd på sulan och vita linjen.



Klövsprickor

3. Horisontella sprickor kan vara en följd av fång.
4. Vertikala sprickor kan uppkomma av okänd anledning eller efter en klövböld.



Bredklöv

Bredklöv är en ärftlig defekt med en onormalt breddad ytterklöv.



Klövböld

En klövböld som öppnat sig i kronranden.



Hyperplasi

Hyperplasi är en utväxt i klövspalthuden.



Klövspalteksem

Klövspalthuden saknar behåring och är irriterad av fukt och miljö.



Fotröta, grad 2

Klövspalthuden är täckt av en vit, smetig beläggning med karaktäristisk lukt.



Fotröta, grad 3

Fotrötan har fortsatt från klövspalthuden till sulans mjuka horn.

Ser du förändringar som liknar fotröta eller CODD?
Kontakta Gård & Djurhälsan för bedömning och provtagning!



CODD, grad 2

Sjukdomen börjar med ett sår vid kronranden som sedan fortsätter in under klövkapseln.



CODD, grad 3

Större delen av klövkapseln har lossnat från underliggande vävnad.

CODD = Contagious ovine digital dermatitis/Smittsam digital dermatit


SKANNA MIG
Läs mer om klövar och klövsjukdomar här:
www.gardochdjurhalsan.se/kunskapsbank/far/klovhalsa-sjukdomar-behandling



Uttalad abaxialfåra

Uttalad abaxialfåra i övergången mellan det hårda hornet och det mjuka hornet på klövens utsida.



Vita linjen-separation

5. Vita linjen har separerat och en ficka bildats innanför ytterväggen. Det lösa hornet måste klippas bort så att fickbildning och eventuella lösa flikar försvinner. TIPS, använd en rosensekatör.

6. Allt löst horn har klippts bort.

